



# BIOPSIA DE PRÓSTATA POR VÍA TRANSRECTAL GUIADA POR ECOGRAFÍA

Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones como preparación para el examen.

## Dos días antes de la biopsia:

- Inicie Ciproflouxacina tabletas de 500 mg cada 12 horas y continúelas hasta acabarlas en 7 días. Cantidad total: 14 tabletas.

## Un día Antes de la biopsia:

- Tomar abundante líquido y no consumir lácteos ni gaseosas.
- Consumir dieta líquida.
- Tomar medio frasco de Citromel a las 2:00 p.m. y el otro medio frasco a las 8:00 p.m.

## El día de la biopsia:

- Entre las 5:00 a.m. y las 6:00 a.m., colocarse vía anal un enema de marca Travad de 150 cc con aplicador rectal. Dicho enema deber ser introducido a través del ano, contenerlo sin dejarlo salir durante 5 minutos y después evacuarlo.
- Inmediatamente después del enema, aplicar óvulo de Isodine.
- Desayunar liviano (agua panela con galletas de soda, no gaseosas no lácteas).



- Debe suspender los siguientes medicamentos si los usa: Aspirina, Asawin, Aspirineta, Ibuprofeno, Diclofenaco o anticoagulantes 10 días antes del examen.
- Debe suspender todos los medicamentos homeopáticos como Ginkgo Biloba, ácidos grasos, Omega 3, Vitamina E o té verde.
- Si está tomando medicamentos de control para hipertensión arterial, epilepsia, diabetes u otras enfermedades que no requieren anticoagulación, se debe seguir tomando con agua incluso el día del examen.
- Debe traer la historia clínica o los resultados de exámenes que le hayan realizado anteriormente y que tengan relación con el procedimiento.
- Debe asistir al examen con un adulto responsable y sin discapacidades
- Llevar los resultados de los siguientes exámenes de laboratorio: T.P, TPT, recuento de plaquetas y ANTg Prostático, que hayan sido realizados en menos de un mes.

**Recuerde:** Al tener en cuenta estas recomendaciones, contribuirá con un correcto diagnóstico. Es indispensable presentar la orden médica al momento de realizarse el examen.