

## Preparación para 17 Hidroxiprogesterona post ACTH para bebés



### ¿Cómo debes preparar al bebé para el examen?

Lee cuidadosamente y sigue estas recomendaciones como preparación para tu examen

- Esta prueba se realiza en la sede de Dinámica en el Hospital Infantil Santa Ana, en Medellín, de lunes a viernes. Debes pedir cita previa en el teléfono 4447428.
- En las demás ciudades, desde nuestra línea de atención te indicarán el laboratorio donde debes realizarte este examen:
  - Bogotá: 489 7904
  - Cali: 380 8956
  - Barranquilla: 319 79 76
  - Resto del país: 01 8000 51 7736
- Los bebés no deben comer alimentos ni tomar bebidas 4 horas antes de la prueba.
- El bebé debe estar en reposo 30 minutos antes de la prueba.
- El bebé debe venir acompañado de un adulto responsable, mayor de 18 años y que no esté en situación de discapacidad.
- Duración de la prueba: 1 hora. Tanto el bebé como su acompañante deben contar con disponibilidad para permanecer en el laboratorio durante el tiempo que dura la prueba. Te recomendamos llevar libros, juegos u otras actividades.

### ¿Qué documentos debes presentar?



Documento de identidad del bebé

Orden médica vigente, este documento es fundamental para realizarte la prueba.



### ¿Qué cuidados debes tener con el bebé durante el examen?

- El bebé no debe comer alimentos ni tomar bebidas durante la prueba.
- Recuerda darle al personal del laboratorio los datos del bebé: edad, peso, medicamentos que toma, dosis de los mismos, motivo de realización del examen, si padece de diabetes o hipoglicemia.
- Pregúntale a nuestro personal de salud otros cuidados que debes tener con el bebé durante el examen.



### ¿Qué cuidados debes tener después del examen?

El bebé puede sufrir de picazón e irritación en el lugar donde le pusieron la inyección.

El bebé puede sufrir de mareos, náuseas, sofoco, malestar y vómito.

Todos estos síntomas son muy leves, son transitorios y no tienes consecuencias permanentes

El bebé puede volver a tomar sus medicamentos el día siguiente de la prueba, siempre siguiendo las recomendaciones de su médico.

En caso de que el bebé tenga complicaciones con los medicamentos, debes llevarlo al servicio de urgencias.

Si tienes alguna duda, consulta con nuestro personal de salud.



### ¿Para qué sirve esta prueba?

- Ayuda a determinar si la glándula pituitaria o la glándula adrenal del bebé funcionan normalmente.
- Se usa, más frecuentemente, cuando se sospecha alguna alteración en la glándula suprarrenal.
- Se realiza inyectándole al bebé la hormona adrenocorticotropa (ACTH).

¡Gracias por tener en cuenta estas recomendaciones que contribuirán con un correcto diagnóstico y el tratamiento que realmente necesitas!