

Preparación para colonoscopia



¿Cómo debes prepararte para el examen?

Lee cuidadosamente y sigue estas recomendaciones como preparación para tu examen

- Si estás embarazada, consulta con tu médico tratante ya que este procedimiento está contraindicado.
- Debe conseguir, con anticipación, los siguientes medicamentos en una farmacia:
 - 2 tabletas de Laxacol o Bisacodilo, si tienes estreñimiento crónico.
 - 4 frascos de solución Travad oral (3 para la preparación y 1 en caso de que vomites).

1 semana antes del procedimiento:

- Si tomas medicamentos que contengan hierro o medicinas que puedan causar sangrado (aspirina, aspirineta, ASA, ácido acetil salicílico, alka seltzer, omega 3, vitamina E, clopidogrel -plavix-, pradaxa, xarelto, eliquis -apixabán-, heparina, fraxiparina, dalteparina, enoxaparina -clexane-, warfarina -coumadin-, ginkgo biloba, pastillas de ajo, vitamina E), consulta con tu médico la posibilidad de suspenderlos y durante cuánto tiempo. En caso de que no dejes de tomarlos, se cancelará el procedimiento por seguridad en el proceso de atención.

- Si tomas medicamentos antiinflamatorios como Ibuprofeno (Advil, Motrin), diclofenaco (Voltarén), naproxeno (Apronax), piroxicam (Feldene), lialgil, dipirona o paracetamol, debes consultar con tu médico tratante para determinar la posibilidad y el tiempo en que debes suspender la medicación.

1 día antes del procedimiento:

- Ten muy en cuenta que no debes comer alimentos sólidos, grasosos y que contengan fibra durante la preparación como: frutas, verduras, linaza, semillas, colorantes, condimentos, gelatina roja.

- No debes tomar bebidas oscuras y de color rojo o morado, como agua de panela, Coca cola o jugos de mora o uva.

- Toma un desayuno liviano con galletas de soda o pan, y un jugo de color claro y sin fibra.

- Tu almuerzo debe ser liviano. Puedes tomarte un caldo o consomé de color claro y comer carne molida y una pequeña porción de arroz, pasta o puré de papa.

- Durante la tarde debes tomar mucha agua y otros líquidos como jugo de manzana muy bien colado y sin residuos o bebidas hidratantes que no sean de color oscuro (Gatorade o Powerade).

- Cuando entres al baño, tus excrementos deben ser completamente líquidos, de color claro y sin residuos.

Si tu examen está programado en la mañana, el día antes del examen debes realizar la siguiente preparación:

- Si tienes antecedentes de estreñimiento crónico, a las 3:00 p. m. debes tomarte 2 pastillas de Bisacodilo o Laxacol.

- A las 4:00 p. m. debes diluir un frasco de Travad oral en una jarra con un litro de agua fría o de jugo de color claro frío. Tómate un vaso lleno cada 15 minutos, hasta terminar el litro de la bebida.

- A las 6:00 p. m. debes diluir el segundo frasco de Travad oral en una jarra con un litro de agua fría o de jugo frío de color claro. Tómate un vaso lleno cada 15 minutos, hasta terminar el litro de la bebida.

- A las 8:00 p. m. debes diluir el tercer frasco de Travad oral en una jarra con un litro de agua fría o de jugo frío de color claro. Tómate un vaso lleno cada 15 minutos, hasta terminar el litro de la bebida.

- En caso de que vomites, debes repetir la toma del líquido más despacio.

- Continúa tomando muchos líquidos claros hasta que te acuestes.

- Una buena preparación se alcanza cuando tus excrementos son totalmente líquidos y sin residuos, como si fueran orina. En caso contrario, debes repetir inmediatamente el proceso realizado con 1 frasco de Travad oral diluido en un litro de agua.

Si tu examen está programado después de las 12:00 del medio día, el día del examen debes realizar la siguiente preparación:

- Si tienes antecedentes de estreñimiento crónico, a las 5:00 a. m. debes tomar 2 pastillas de Bisacodilo o Laxacol.

- A las 6:00 a. m. debes diluir un frasco de Travad oral en una jarra de un litro de agua fría o de jugo frío de color claro. Tómate un vaso lleno cada 15 minutos, hasta terminar el litro de la bebida.

- A las 8:00 a. m. debes diluir el segundo frasco de Travad oral en una jarra con un litro de agua fría o de jugo frío de color claro. Tómate un vaso lleno cada 15 minutos, hasta terminar el litro de la bebida.

- A las 10:00 a. m. debes diluir el tercer frasco de Travad oral en una jarra con un litro de agua fría o de jugo frío de color claro. Tómate un vaso lleno cada 15 minutos, hasta terminar el litro de la bebida.

- En caso de que vomites, debes repetir la toma del líquido más despacio.

- Una buena preparación se alcanza cuando tus excrementos son totalmente líquidos y sin residuos, como si fueran orina. En caso contrario, debes repetir inmediatamente el proceso realizado con 1 frasco de Travad oral diluido en un litro de agua.

Día del procedimiento:

- 6 horas antes del examen no debes comer alimentos ni tomar líquidos.


- Si tomas algún medicamento para la hipertensión, enfermedades del corazón, epilepsia o tiroides, tómatelos con poca agua.

- Si usas inhaladores para problemas respiratorios, llévalos ya que puede necesitarlos durante la realización del examen.

- Debes llegar al examen 30 minutos antes para actualizar tus datos en el sistema, para que te expliquen el examen, revises tu preparación y apruebes la realización del procedimiento.


En caso de que no hayas cumplido con las anteriores indicaciones, tu examen será cancelado por tu seguridad y deberemos reprogramarlo.

¿Qué documentos debes presentar?




Documento de identidad

Orden médica vigente, este documento es fundamental para realizarte la prueba.



Colonoscopias que te hayan realizado



¿Qué cuidados debes tener durante el examen?

- Pregúntale a nuestro personal de salud los cuidados que debes tener durante el examen.



¿Qué cuidados debes tener después del examen?

No puedes manejar, ni movilizarte en moto o en bus.

Si tienes alguna duda, consulta con nuestro personal de salud.



¿Para qué sirve esta prueba?

- Para diagnosticar y tratar enfermedades de tu intestino grueso (colon).

El médico tratante debe remitir a un centro hospitalario de tercer o cuarto nivel, si el paciente:

- Tiene síndrome de Down, discapacidad mental o trastorno psiquiátrico descompensado.
- Es menor de 15 años
- Ha presentado en las últimas 8 semanas un accidente cerebro vascular o un infarto cerebral o del corazón
- Utiliza oxígeno domiciliario
- Sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica -EPOC-, bronquitis crónica, enfisema pulmonar o asma.
- Usa dispositivo de presión positiva en las vías respiratorias -CPAP- o sufre problemas de respiración durante el sueño (apnea del sueño).
- Ha tenido crisis de asma en los últimos 8 días
- Tiene cáncer de pulmón
- Sufre de obesidad mórbida
- Tiene insuficiencia cardíaca descompensada (hinchazón por la acumulación de líquidos y dificultad para respirar).
- Sufre de enfermedad en las válvulas cardíacas
- Ha tenido cirugía de pulmón en los últimos 2 meses de naranja.

¡Gracias por tener en cuenta estas recomendaciones que contribuirán con un correcto diagnóstico y el tratamiento que realmente necesitas!