

Preparación para Androstenediona pre y pos ACTH para bebés



¿Cómo debes preparar al bebé para el examen?

Lee cuidadosamente y sigue estas recomendaciones como preparación para el examen

- Estas son las líneas de atención donde puedes pedir la cita:
 - Bogotá: 489 7904
 - Medellín: 444 74 28
 - Cali: 380 8956
 - Barranquilla: 319 79 76
 - Resto del país: 01 8000 517 736
- 3 semanas antes de la prueba, el bebé debe mantener la dieta recomendada por su médico. No debes hacer cambios en su alimentación.
- El bebé no puede comer alimentos ni beber líquidos entre 4 y 6 horas antes del examen.
- Recomendamos que el bebé no tome medicamento hormonal el día de la prueba. Sigue las indicaciones de su médico.
- El bebé debe asistir al laboratorio con un acompañante mayor de 18 años y que no esté en situación de discapacidad.
- Duración de la prueba: entre 1 y 4 horas. Tanto el bebé como su acompañante deben contar con disponibilidad para permanecer en el laboratorio durante este tiempo. Te recomendamos llevar libros, juguetes u otras actividades.
- El cumplimiento de estos horarios es de suma importancia para la adecuada realización de la prueba.

¿Qué documentos debes presentar?



Documento de identidad del bebé

Orden médica vigente, este documento es fundamental para realizarte la prueba.



¿Qué cuidados debes tener con el bebé durante el examen?

- El acompañante del bebé debe seguir las indicaciones de nuestro personal de salud.
- El bebé no debe comer alimentos ni tomar bebidas durante la prueba.
- Recuerda darle al personal del laboratorio los datos del bebé: edad, peso, medicamentos que toma, dosis de los mismos, motivo de realización del examen, si padece de diabetes o hipoglicemia.
- Pregúntale a nuestro personal de salud otros cuidados que debes tener con el bebé durante el examen.



¿Qué cuidados debes tener con el bebé después del examen?

Puede irritarse y tener picaduras en la piel, en el lugar donde le pusieron la inyección.

Puede sufrir mareos, náuseas, vómito, sofoco o malestar.

Debe volver a tomar sus medicamentos el día siguiente de la prueba, siempre siguiendo las recomendaciones de su médico.

En caso de que el bebé tenga complicaciones con los medicamentos, debes llevarlo al servicio de urgencias.

Si tienes alguna duda, consulta con nuestro personal de salud.



¿Para qué sirve esta prueba?

- La androstenediona es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, los ovarios (en las mujeres) y los testículos (en los hombres).
- Esta prueba se realiza para detectar enfermedades que se pueden generar por el mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales del bebé, como la enfermedad de Addison, hipopituitarismo o hiperplasia suprarrenal congénita.
- Se realiza inyectando la hormona adrenocorticotropa (ACTH).

¡Gracias por tener en cuenta estas recomendaciones que contribuirán con un correcto diagnóstico y el tratamiento que realmente necesitas!