

Preparación para Androstenediona pre y pos ACTH para niños



¿Cómo debes preparar al niño para el examen?

Lee cuidadosamente y sigue estas recomendaciones como preparación para tu examen

- Las siguientes son las líneas de atención donde puedes pedir la cita:
 - Bogotá: 489 7904
 - Medellín: 444 74 28
 - Cali: 380 8956
 - Barranquilla: 319 79 76
 - Resto del país: 01 8000 517 736
- 3 semanas antes de la prueba, el niño debe mantener la dieta recomendada por su médico. No debes hacer cambios en su alimentación.
- El niño no puede comer alimentos ni beber líquidos entre 6 y 10 horas antes del examen.
- El niño no debe realizar ejercicio antes de la prueba.
- Te recomendamos no darle al niño el medicamento hormonal el día de la prueba. Sigue las indicaciones de su médico.
- El niño debe asistir al laboratorio con un acompañante mayor de 18 años y que no esté en situación de discapacidad.
- Duración de la prueba: entre 1 y 4 horas. Tanto el niño como su acompañante deben contar con disponibilidad para permanecer en el laboratorio durante este tiempo. Te recomendamos llevar libros, juguetes u otras actividades.
- El cumplimiento de estos horarios es de suma importancia para la adecuada realización de la prueba.

¿Qué documentos debes presentar?



Documento de identidad el niño

Orden médica vigente, este documento es fundamental para realizarte la prueba.



¿Qué cuidados debes tener durante el examen?

- El niño y su acompañante deben seguir las indicaciones de nuestro personal de salud.
- El niño no debe realizar ejercicio durante la prueba.
- El niño no debe comer alimentos ni tomar bebidas durante la prueba.
- Recuerda darle al personal del laboratorio los datos del niño: edad, peso, medicamentos que toma, dosis de los mismos, motivo de realización del examen, si padece de diabetes o hipoglicemia.
- Pregúntale a nuestro personal de salud otros cuidados que debes tener con el niño durante el examen.



¿Qué cuidados debes tener después del examen?

El niño puede sufrir irritación y picaduras en la piel, en el lugar donde le pusieron la inyección.

El niño puede sufrir mareos, náuseas, vómito, sofoco o malestar.

El niño debe volver a tomar sus medicamentos el día siguiente de la prueba, siempre siguiendo las recomendaciones de su médico.

En caso de que el niño tenga complicaciones con los medicamentos, debes llevarlo al servicio de urgencias.

Si tienes alguna duda, consulta con nuestro personal de salud.



¿Para qué sirve esta prueba?

- La androstenediona es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, los ovarios (en las mujeres) y los testículos (en los hombres).
- Esta prueba se realiza para detectar enfermedades que se pueden generar por el mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales del niño, como la enfermedad de Addison, hipopituitarismo o hiperplasia suprarrenal congénita
- Se realiza inyectando la hormona adrenocorticotropa (ACTH).

¡Gracias por tener en cuenta estas recomendaciones que contribuirán con un correcto diagnóstico y el tratamiento que realmente necesitas!