



Preparación para

Cortisol pre y post Dexametasona

Sigue estas recomendaciones

como preparación para tu examen.

Ten en cuenta la edad del paciente en el momento de realizar la preparación.

3 días
ANTES DEL EXAMEN



3 días antes de la prueba, no debes tomar licor.



Los adultos no deben comer alimentos ni beber líquidos entre 8 y 12 horas antes de realizarse la prueba.



Los niños no deben comer alimentos ni beber líquidos entre 6 y 10 horas antes de realizarse la prueba.



Los bebés no deben comer alimentos ni beber líquidos entre 4 y 6 horas antes de realizarse la prueba.



Es posible que te pidan que dejes de tomar algunos medicamentos por un período de 24 a 48 horas antes de que te saquen la sangre. Estos medicamentos incluyen pastillas anticonceptivas, aspirina, morfina, metadona, litio, inhibidores de la monoaminooxidasa (MAOI) y diuréticos. Sigue las indicaciones de tu médico.

EL DÍA DE LA PRUEBA LLEVAR:



● Documento de identidad.



● Orden médica vigente y autorización del servicio, si tu EPS o tu plan de salud así lo requieren. Estos documentos son fundamentales para realizarte la prueba.



¡Gracias por tener en cuenta estas recomendaciones que contribuirán con un **correcto diagnóstico y el tratamiento que realmente necesitas!**